


TRANSMISSION
Pagkatakod



TB is spread from person to person through the air. When an untreated infected person coughs, sneezes, talks or sings, the airborne particle released is inhaled by another person and becomes infected.


Matakod ang TB pinaagi sa hangin. Kung ang isa ka tawo na naay TB mag-ubo, mag-hatsi, mag-istorya o mag-kanta, pwede ma-simhotan sa tawo na duol sa iyaha ang lagdo na naay TB.



DIAGNOSIS
Pag-ila

A Presumptive TB patient (with one of the Cardinal symptoms or a positive chest X-ray) needs to have his/her phlegm examined through Rapid TB Diagnostic Test such as Gene Xpert to confirm the diagnosis of TB.

Ang pasyente na naay Presumptive TB (ang adunay isa sa mga sintomas o positibo sa chest X-ray) ay kinahanglan na magpasa ug plema para makumpirma ang sakit na TB pinaagi sa Rapid TB diagnostic test o GeneXpert.



TREATMENT
Pagpanambal

It is important to take the recommended regimen of anti-TB treatment to avoid the risk of drug resistance and complicated course

Importante nga inomon ang gi rekomendar nga onom(6) ka bulan nga programa sa pag inom sa tambal para sa TB aron malikayan ang ang mga komplikasyon dala sa pag putol sa pag inom, abi na ang gitawag na og DRUG RESISTANCE COURSE



Complete the prescribed 6-month course of treatment for drug susceptible TB even if you feel better early on. (2 months intensive phase and 4 months maintenance phase)

KUMPLETOHON ang onom (6) ka bulan nga programa sa pag inom sa tambal para sa drug susceptible TB bisan naayo na ang paminaw.

The number of tablets that one must take depends on the patient's weight.

Ang kadaghan sa tablet ana gina inom kada adlaw ay base sa timbang sa pasyente.

Remember, it is only the doctor who shall advise on when to stop treatment.

PAHINOMDOM

Ang doctor lang ang pwede mag ingon kung kanus-a undangon ang pag inom ug tambal kontra sa TB.